



# INFO FOLDER



ANNE VAN DIJK RIJSTONDERZOEKSCENTRUM NICKERIE

## De meest voorkomende rijstplagen en onkruiden in Suriname

Ziekte/Plaaag	Schade	Schadelijke periode	Chemische bestrijding	Andere maatregelen (Cultuurmaatregelen)
Slakken 1. <i>Pomacea diliodes</i> 2. <i>Pomacea glauca</i>	Afgebeten kiemplantjes	Tot ongeveer 2 week na inzaai	Fentin Acetaat <sup>1</sup>	Veld droogleggen
Bibitvlieg <i>Hydrellia deonieri</i>	Wit-gele gangen in de bladeren	1-4 weken na inzaai	Insecticide <sup>1</sup>	Vroege inzaai en veld droogleggen
Thrips <i>Stenchaetothrips biformes</i>	Eerst vergeling dan roodoranje verkleuring van de planten	1-4 weken na inzaai	Insecticide <sup>1</sup>	Planten 2-3 dagen onderwater zetten
Spodoptera rupsen (Gadhaila) <i>Spodoptera frugiperda</i>	Opgevreten bladeren en stengels	1-6 weken na inzaai	Insecticide <sup>1</sup>	Goede stroverbranding en droge grondbewerking, ook dammen en kavelsloten schoonhouden
Zaadwantsen <i>Oebalus poecilus</i>	Lege korrels	Vanaf bloei	Insecticide <sup>1</sup>	Korte inzaaiperiode <sup>2</sup> , niet te vroeg of te laat inzaaien, dammen schoonhouden
Stengelboorders <i>Rupella albinella</i>	Lege aren (pluimen)	4-15 weken na inzaai	Insecticide <sup>1</sup>	Goede stroverbranding en droge grondbewerking, ook dammen en kavelsloten schoonhouden
Helodytus "wormen" <i>Lissorhoptrus foveolatus</i>	Afgebeten kiemplantjes Afgebeten wortels	Tot ongeveer 1-2 weken na inzaai	Insecticide <sup>1</sup>	Veld droog leggen
Zuigende insecten (Delphaciden, Jassiden) - <i>Sogata oryzicola</i> - <i>Draeculacephala clypeata</i>	Geel-oranje verkleuring (verbranding) van de planten	4-10 weken na inzaai	Insecticide <sup>1</sup>	Korte inzaaiperiode <sup>2</sup> , ureumbemesting in 3 keren, normale zaaidichtheid en af en toe water aflaten.
Sprinkhanen <i>Conocephalus cineris</i>	Opgevreten bladtoppen	4-15 weken na inzaai	Insecticide <sup>1</sup>	Korte inzaaiperiode <sup>2</sup>
Ratten <i>Holochylus brasiliensis</i>	Afgebeten stengels en pluimen	1-15 weken na inzaai	Rattengif (op 5 plaatsen per hectare)	Doodslaan en dammen en kavelsloten schoon houden
Djhoesa <i>Fimbristylis miliacea</i>	Zwakke uitstoeling, kleine aren	Gehele groeiduur	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,4-D (4 weken na inzaai). Met propanil op 3 weken na inzaai</li><li>• Nomina (2-3 weken na inzaai)</li></ul>	Onderwater inzaaien
Moraina <i>Ischaemum rugosum</i>	Zwakke uitstoeling, kleine aren	Gehele groeiduur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Propanil (2 weken na inzaai)</li><li>• Nomina (2-3 weken na inzaai)</li></ul>	Onderwater inzaaien
Rode rijst <i>Oryza spp.</i>	Zwakke uitstoeling, kleine aren	Gehele groeiduur	–	Voorkiemen en modderen, onderwater inzaaien en selecteren.
Padiegras <i>Luziola spruceana</i>	Zwakke uitstoeling	Gehele groeiduur	2,4-D of Nomina	
Pindagrass <i>Sphenoclea zeylanica</i>	Zwakke uitstoeling	Gehele groeiduur	2,4-D of Nomina (5 weken na inzaai)	Onderwater inzaaien, goed egaliseren en balken

1: **Insecticidebespuiting: zie folder december 2005; bemestings- en chemicaliënadvies.**

2: **Korte inzaaiperiode: periode van 6-7 weken en geldt voor geheel Nickerie.**

Voor meer informatie, maak contact met het ADRON. Europolder Noord Serie 2 No. 16 of  
Tel: 0317579 en 0317580.